



PINGOUIN TORDA

Alca torda

39cm



Pour l'observer il faut se concentrer au niveau de la surface de l'eau.



Le vol du pingouin est marqué de rapides battements d'ailes et par une trajectoire rectiligne souvent au ras de l'eau.



Le pingouin torda se déplace toujours en groupe de plusieurs individus.





PUFFIN YELKOUAN

Puffinus yelkouan



40cm




Pour l'observer il faut se concentrer au niveau de la surface de l'eau.



Le vol du puffin va alterner quelques battements d'ailes (3 ou 4) avec un vol plané.



Le puffin yelkouan attend la tombée de la nuit pour rejoindre leurs colonies. Ils sont pélagiques.



STERNE NAINE

Sterna albifrons

28cm



La sterne naine fréquente uniquement les étangs et les mares. Pour pêcher elle pique brusquement sur les petits poissons qui nagent sous la surface, après un bref vol de reconnaissance.



Le vol de la sterne naine est léger, rapide et saccadé.



La sterne naine niche en petites colonies sur les plages. Elle pond entre mai et juin.



Statut de conservation IUCN



STERNE PIERREGARIN

Sterna hirundo



39cm




La Sterne pierregarin a le bec rouge et les pattes rouges.



C'est un oiseau bruyant au vol souple et élégant.
C'est une visiteuse d'été (d'avril à septembre).



Elle se nourrit de petits poissons qu'elle capture en plongeant dans l'eau de manière spectaculaire.



FOU DE BASSAN

Morus bassanus

100cm




Le Fou de Bassan est bien reconnaissable avec sa tête hornée de doré et le bout de ses longues ailes noires.



Le Fou est un très bon planeur et n'hésitera pas à "prendre les vents" pour éviter de s'épuiser.



Le Fou de Bassan adopte une posture aérodynamique lui permettant de rentrer dans l'eau à 100km/h sans se blesser. Il plonge ainsi à 6-7 mètres de profondeur.



MOUETTE TRIDACTYLE

Rissa tridactyla

40cm




La mouette tridactyle a un bec jaune uni et des pattes palmées noires. De plus, contrairement aux goélands, les taches blanches sont absentes sur la partie noire terminale des ailes.



La morphologie de la mouette n'est pas adaptée à la vie sur la terre ferme : ses courtes pattes sont inaptes à la marche mais permettent la station sur des rochers.



La mouette tridactyle est à la fois diurne et nocturne.





MOUETTE MÉLANOCÉPHALE

Ichthyaetus melanocephalus

38cm

 La mouette mélanocéphale a la tête entièrement noire jusqu'au cou pendant la période nuptiale. Elle possède un bec et des pattes rouges.

 En plumage internuptial, il ne reste du capuchon noir qu'une tache couvrant l'œil et l'oreille.

 Le cri habituel peut se traduire par "heiiin" .



MOUETTE RIEUSE

Chroicocephalus ridibundus



43cm




La mouette rieuse se repère grâce à sa tache noire sur sa joue et son bec à et ses pattes rouges.



En été son plumage nuptial se transforme en tête noire mais ne descend pas jusqu'au cou comme chez la mouette mélanocéphale.



La mouette rieuse se reproduit en lisière des lacs et des étangs, c'est la plus commune de notre côte.





GOÉLAND LEUCOPHÉE

Larus michahellis



68cm



Le Goéland leucophée se reconnaît grâce à son bec robuste jaune avec la pointe rouge. Ses rectrices (plumes de la queue) sont noires avec des tâches blanches.



Le Goéland est opportuniste, présent sur toutes nos côtes il sait s'adapter à tout habitat.



Le Goéland leucophée porte son plumage d'adulte à partir de sa 4ème année.



Huîtrier pie

Haematopus ostralegus



48cm




Ce robuste échassier est entièrement noir et blanc. Le bec, long et rectiligne, est rouge orangé. Il possède aussi des pattes roses.



Les huitriers pie se déplacent souvent en couple.



Il se révèle particulièrement habile pour ouvrir les coquillages en les martelant ou en écartant les valves et en sectionnant avec son bec le muscle qui les relie.



Chevalier Guignette

Actitis hypoleucos



21cm




Le Chevalier guignette est un limicole, c'est à dire littéralement un "oiseau de rivage".



Le Chevalier guignette a une longue queue non couverte par ses ailes modérées.



Le Chevalier guignette en recherche de nourriture parcourt lentement pieds dans l'eau l'écotone terre/eau douce à la recherche des invertébrés dont il se nourrit.



Tournepierre à collier

Arenaria interpres

26cm



Le Tournepierre à collier est également un oiseau de rivage, c'est un limicole.



Ce petit échassier a un plumage noir, blanc et marron-roux. Les pattes, assez courtes, sont rouges orangées.



C'est un grand migrateur allant jusqu'en Afrique. La population de tournepierres hivernant en France est estimée à 6 000 oiseaux, la plupart résidant en Bretagne.

Statut de conservation IUCN



Sterne caugek

Thalasseus sandvicensis

46cm



La sterne a un bec long et noir, une huppe érectile qui prolonge sa calotte noire. Elle a une silhouette fine et harmonieuse.



Au Grau du Roi on observe les sternes le long de la plage de l'Espiguette sur les grosses bouées jaunes au large.



Pour repérer ses proies, la sterne caugek vole sur place, son bec noir pointé vers le bas. Les plongeurs sont à la verticale ou en oblique, et pratiquement toujours couronnés de succès





Gravelot à collier interrompu

Anarhynchus alexandrinus

18cm



Le Gravelot à collier interrompu a un corps gris-brun, dessous blanc, un sourcil blanc et un collier blanc.



Il est différent des autres gravelots grâce à son demi-collier noir s'interrompant sur la poitrine, bec et pattes noires.



C'est un oiseau très nerveux. Il parcourt assidument le littoral en alternant marche rapide et courte pause.

